



Rechineta, chineta, cheneta, gineto, xeneta, charla, tremastela, tremostela, jineta, ginesta
Inglés: *Small-spotted genet*, Francés: *genette commune*, Alemán: *Kleinflecken-ginsterkatze*

Se la considera mejor cazadora que el lince, más astuta que el zorro y retorcida como una serpiente, (*La España agreste*, 1892). Es un animal eminentemente africano que llegó aquí de la mano de los musulmanes o de los fenicios al igual que el meloncillo, aunque este punto no está muy claro llegándose a esta conclusión por la absoluta falta de sus restos en yacimientos prehistóricos y datos históricos, aunque últimamente se ha especulado que entrará andadando a través de un pasillo entre África y la península creado por erupciones volcánicas.

Descripción

Se parece a un pequeño gato, moteado como un guepardo y con una cola muy larga y anillada, caracteres estos que la hacen inconfundible. El dimorfismo sexual es pequeño siendo machos y hembras similares. En algunos casos se da el melanismo en las jinetas y color resulta muy oscuro pudiendo confundirse con una garduña, tamaño y grosor de la cola serán una pista.

CC: 44-58cm, Ps: 1-2,5kg



Foto: Cesar Luque

Hábitat

Es una especie totalmente silvícola alejándose muy poco del bosque y siempre con algo de arbolado o arbustos, estando presente en cualquier tipo de bosques y en las zonas más áridas o sin bosques se refugia en los sotos ribereños donde llega a ser especialmente abundante. En las riberas del Ebro, concretamente en el galacho (*meandro abandonado*) de Juslibol resulta curioso sus numerosos rastros frente a los de la garduña pero en que salimos de los sotos la garduña es más numerosa, también es cierto que no hay arbolado fuera del soto.

Los roquedos, sobre todo calizos, entre bosques son lugares que le atraen especialmente y donde tendremos altas posibilidades de localizar sus letrinas y encames.

No le gusta mucho el frío y en el norte es difícil localizarla por encima de los 800-900 metros de altitud aunque en situaciones especiales puede llegar mucho más alto, por ejemplo en las Gargantas de Escuaín (*este del parque nacional de Ordesa*) donde aprovechando la ladera sur el encinar asciende hasta los 1.400ms y con él la jineta.

Y no tiene duda en ocupar los entornos urbanos.

Galacho de Juslibol, a la derecha el cortado, la jineta es abundante en el soto y la garduña en el cortado adentrándose por la zona esteparia de los alrededores




Distribución

Se reparte de forma muy uniforme por toda la península, Mallorca y Menorca.

Biología

Vive hasta 15 años en cautividad, en libertad mucho menos. Madurez sexual a los 2 años.

Hay partos entre marzo y noviembre. 2-3 (1-4) crías en algunos casos dos camadas al año.



Costumbres

Su dieta es muy carnívora, comiendo rara vez alimentos de origen vegetal, higos y uva especialmente, por lo que se le puede incluir dentro del grupo de los cazadores especializados. Es un nocturno nato de costumbres esquivas que vive en la espesura, motivos por los cuales es un animal muy desconocido.

Es una especie solitaria.

La jineta llega a acostumbrarse muy bien a la presencia humana, no en vano es uno de los pocos mamíferos salvajes que han sido domesticados y han vivido con el hombre de la misma forma que un gato, de hecho es de los más confiados ante las trampas fotográficas o en vivo.

Durante la construcción del aula de la naturaleza de Valdemanzano en el Moncayo (Zaragoza) los trabajadores solían desayunar acompañados de una jineta. Y aunque es desconocido por la mayoría de la gente es de los mamíferos que más se acerca a las zonas humanizadas, encontrándose presente dentro de las zonas urbanas, incluso en ciudades como Zaragoza.



Citas de jineta en Zaragoza, 1997-2010 y un ejemplar fototrampeado en la noche de navidad de 2018

En varias temporadas de trampeo en vivo en la ribera del Ebro y zonas adyacentes el resultado de 3.811 trampas/noche fue de 20 rattus, 10 garduñas, 4 gatos domésticos, 7 visones europeos y 29 jinetas.

Son poco agresivas en general, de hecho de las 29 jinetas trampeadas ni una sola mostró agresividad y en bastantes casos hubo que sacarlas de las trampas volcando estas o tirando del rabo del animal.

No son raros los casos de melanismo que se manifiesta en un pelaje muy oscuro que se podría confundir con el de la garduña, la cola muy larga y fina le delata.



Jinetas trampeadas en la ribera del Ebro dentro de un estudio de seguimiento del visón europeo



Para su ubicación elige casi siempre lugares elevados que pueden estar al aire libre o en mitad de un cañaveral, incluso en algunas ocasiones sobre puentes viejos con poco tráfico en los pilares y salientes. Pero en esto, como en otros muchos aspectos las normas se saltan dependiendo de la zona ya que en zonas de la costa catalana con abundante presencia de jinetas y una gran cantidad de barracas y muros de piedra seca ideal para ubicar letrinas estas no aparecen, por lo que la jineta las debe de ubicar entre la maraña de xmilas aspera.



Esta foto de letrina se hizo en 1996 durante el segundo sondeo nacional de nutria en un puente sobre el río Arba (Zaragoza) y seguía allí al realizar el cuarto en el año 2016

Rastros

El tamaño de los excrementos es muy variable, normalmente mide 1x10 cm, raras veces más pequeño, pero muy a menudo superan ampliamente este tamaño llegando a 1,5x15cm. La mayoría de las veces los deposita en letrinas (cagarruteros) donde acumula hasta un centenar de excrementos.





Los coloca también en cortados y repisas, pequeñas cuevas o recovecos, muros, árboles, coches abandonados, bidones, etc. Estas letrinas son usadas por varios individuos a la vez. Las huellas tienen cinco dedos en pies y manos y en estas un pequeño talón y solo marca las uñas cuando salta o se resbala.



Gato doméstico *Jineta*

Siempre que puede encama en lo alto: árboles, roquedos... A falta de buenos lugares para encamar en las alturas utiliza la maraña, preferentemente entre los zarzales.